



APOYO SOCIAL PERCIBIDO Y RESILIENCIA EN PACIENTES SOBREVIVIENTES DE QUEMADURAS DEL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, 2017



Katherine Changanuqui Aquino; Wilson Campos Toledo; Roller Cueva Torres, Jhony A. De La Cruz Vargas

INTRODUCCIÓN

- Las quemaduras son a menudo un evento devastador con efectos físicos y psicosociales a largo tiempo.
- Constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y provocan alrededor de 265 000 muertes al año, de las cuales la mayoría se produce en los países de ingreso bajo y mediano, y casi la mitad, en la región de Asia Sudoriental de la OMS. Se cuentan entre las principales causas de pérdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad en los países de ingreso bajo y mediano.
- El análisis epidemiológico, genera importantes reflexiones acerca de dicha problemática, que tiene consecuencias físicas importantes en la víctima y que han sido ya señaladas en la literatura médica, sin embargo, las consecuencias en las víctimas van más allá de las cicatrices, cambios de coloración en la piel o pérdida de algún miembro del cuerpo, éstas se extienden al rechazo hacia sí mismos, sentimientos de culpa, aislamiento, y auto humillación.

OBJETIVO

- Determinar la asociación entre el apoyo social percibido y la resiliencia en pacientes sobrevivientes de quemaduras del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen en el año 2017.

MATERIALES Y MÉTODOS

- El diseño del presente estudio es observacional, analítico y transversal.
- Se hizo una prueba piloto en 30 pacientes sobrevivientes de quemaduras del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.
- Se aplicaron 2 encuestas para medir las variables en estudio

RESULTADOS

- De acuerdo a los resultados de la tabla 01, se determina que existe una relación estadísticamente significativa 0,000 ($p < 0,05$) y altamente directa entre el apoyo social percibido y la resiliencia.

Tabla 1. Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre el apoyo social percibido y la resiliencia en pacientes sobrevivientes de quemaduras del hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 2017 (n=30)

		RESILIENCIA	
Rho de Spearman	APOYO SOCIAL PERCIBIDO	Coefficiente de correlación	,652**
		Sig. (bilateral)	,000
		N	30

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).




Gráfico 1. Niveles de apoyo social percibido en pacientes del sexo femenino, sobrevivientes de quemaduras del hospital Guillermo Almenara Irigoyen en el año 2017.




Gráfico 2. Niveles de apoyo social percibido en pacientes del sexo masculino, sobrevivientes de quemaduras del hospital Guillermo Almenara Irigoyen en el año 2017.

CONCLUSIÓN

- Se determina que, a mayor apoyo social percibido, mayor será la capacidad de resiliencia en los pacientes sobrevivientes de quemaduras del hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 2017
- El apoyo social percibido, de acuerdo al sexo, es mayor en el sexo femenino en comparación al sexo masculino en los pacientes sobrevivientes de quemaduras del hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 2017

BIBLIOGRAFÍA

- F. Solís F.C. Domic ,R. Saavedra, A. González. Incidencia y prevalencia de las lesiones por quemaduras en menores de 20 años. Rev Chil Pediatr 2014; 85 (6): 674-681
- Masood A, Masud Y, Mazahir S. Gender differences in resilience and psychological distress of patients with burns. Elsevier; 2016
- Quezada Berumen L, González Ramírez M., Mecott Rivera G. Resiliencia en Pacientes Pediátricos Sobrevivientes de Quemaduras, Acta de investigación psicológica, 2014, 4 (2), 1585 – 1594.